

**Nálezy modráska štírovníkového (*Cupido argiades*) (Lepidoptera: Lycaenidae)
v severních Čechách v roce 2019**

**Records of the Short-tailed Blue (*Cupido argiades*) (Lepidoptera: Lycaenidae)
in northern Bohemia in the year 2019**

Zbyněk HAVELDA

Alej 17. listopadu 1740, CZ-410 01 Roudnice nad Labem;
e-mail: zbynekhavelda@centrum.cz

Abstract. The paper provides new data on the occurrence of the Short-tailed Blue (*Cupido argiades* (Pallas, 1771)) in northern Bohemia.

Key words: Lepidoptera, *Cupido argiades*, northern Bohemia, Czech Republic, faunistics

Modrásek štírovníkový (*Cupido argiades* (Pallas, 1771)) je palearktický druh rozšířený od jz. Evropy po Japonsko. Na Moravě a ve Slezsku se motýl v poslední době šíří a začíná pronikat i do jižních a východních Čech (Čížek & Marhoul 2019). V západní polovině Čech je prozatím situace jiná, v posledních desetiletích zde vymizel a lze hovořit pouze o jednotlivých nálezech. Situaci dobře ilustruje mapa výskytu tohoto druhu v Nálezové databázi ochrany přírody (AOPK 2019). Sám jsem se v Čechách naposledy setkal s motýly v Praze-Karlíně v roce 1974 a od té doby jsem je nepozoroval. Vzhledem k situaci na Moravě je však možné očekávat další šíření tohoto druhu na nová stanoviště, a to i v Ústeckém kraji.

V nedávno vydané knize o motýlech s denní aktivitou Ústeckého kraje (Čížek & Marhoul 2019) autoři uvádějí, že zde byl v posledním desetiletí tento druh zastížen jen pětkrát, a zároveň zmiňují důvody, proč jej prozatím řadí jen mezi druhy ohrožené, nikoliv kriticky ohrožené.

V roce 2019 jsem tohoto modráska cíleně nehledal, nicméně jsem ho v terénu celkem dvakrát pozoroval, a to dne 11.VIII.2019 nedaleko železniční trati ve Lbíně, mapové pole 5349, nadmořská výška 190 m (obr. 1) a dne 25.VIII.2019 na východním okraji Radovesické výsypky poblíž vodních nádrží u Kostomlat pod Milešovkou, mapové pole 5449, nadmořská výška 400 m (obr. 2). Vzhledem k nevelké vzdálenosti obou lokalit od sebe (asi 6 km) a nedávnému nálezu (2018) na Radovesické výsypce v okolí vrchu Chlomek (Čížek & Marhoul 2019) je možné, že je zde motýl častější a může být přehlížen (zvláště pokud je olétaný) mezi jinými druhy modrásků. V oblasti Radovesické výsypky je to například modrásek černolemý (*Plebejus argus*), kterého jsem tam v červenci pozoroval v populaci přesahující tisíc exemplářů a v srpnu se vyskytoval dosti hojně na stejném místě jako druh *Cupido argiades*.

LITERATURA

- AOPK ČR 2019: Nálezová databáze ochrany přírody: *Cupido argiades*. *Nálezová databáze ochrany přírody*, https://portal.nature.cz/publik_syst/nd_nalez-public.php?idTaxon=31661 (accessed 3. September 2019).
ČÍŽEK O. & MARHOUL P. (eds) 2019: *Denní motýli v Ústeckém kraji, síťový atlas rozšíření*. Ústecký kraj, Ústí nad Labem, 404 pp.



Obr. 1/Fig. 1. *Cupido argiades*, Lbin, 11.VIII.2019.



Obr. 2/Fig. 2. *Cupido argiades*, Kostomlaty pod Milešovkou, 25.VIII.2019.